



آمادگی های مورد نیاز قبل از مراجعه به واحد تصویربرداری

گرافی ها	
نام تست	آمادگی های لازم
رادیوگرافی ساده شکم - فقرات کمری-KUB	نیاز به آمادگی ندارد ولی در صورت درخواست پزشک معالج: ۱-روغن کرچک یک شیشه (۶۰ گرم) نیم ساعت بعد از شام (صرف شام ساعت ۸). ۲-صبح، حتما ناشتا مراجعه شود.
IVP	۱-روغن کرچک یک شیشه (۶۰ گرم) نیم ساعت بعد از شام (صرف شام ساعت ۸). ۲-صبح، حتما ناشتا مراجعه شود
باریم انما	۱-ساعت ۹ شب قبل از انجام آزمون یک شیشه روغن کرچک میل نماید. ۲-دو عدد قرص بیزاکودیل را ساعت ۱۱ شب میل نماید. ۳-شیاف بیزاکودیل را ساعت ۷ صبح روز رادیوگرافی از مقعد استعمال کند. ۴-شام سوپ صاف شده میل نماید. ۵-استعمال دخانیات نکند و خوردن نوشابه ممنوع است. ۶-لباس راحتی بدون دکمه و زیپ و دیگر چیزهای حاجب(هر چیز فلزی یا پلاستیکی) به همراه داشته باشد. ۷-روز انجام آزمون کاملاً ناشتا باشد. ۸-"قابل توجه بانوان" انجام این آزمون در ایام قاعدگی ممکن نمی باشد. ۹-وسایل زیر را از داروخانه تهیه نماید و در روز آزمون به همراه داشته باشد. سولفات باریم سه بسته ایرانی یا یک بسته خارجی رکتال تیوپ سایز ۳۲ یک عدد دستکش لاتکس سایز ۸ یک عدد
ترانزیت روده	۱- شام غذای مختصر میل نماید. ۲- هشت ساعت قبل از انجام آزمون رادیوگرافی ناشتا باشد. ۳- در صورتی که عمل جراحی مربوط به روده، مری و معده انجام داده اید، به مسئول پذیرش اطلاع دهید. ۴- لباس راحتی بدون دکمه و زیپ و دیگر چیزهای حاجب(هر چیز فلزی یا پلاستیکی) به همراه داشته باشد. ۵- سه بسته پودر سولفات باریم از داروخانه تهیه و به همراه داشته باشد
در بقیه موارد رادیو گرافی نیاز به آمادگی نیست	
سونوگرافی ها	



نام تست	آمادگی لازم
سونوگرافی کبد و کیسه صفرا	۱-عدم مصرف غذای چرب و لبنیات از شب قبل ۲-روغن گرچک یک شیشه (60 گرم) نیم ساعت بعد از شام (صرف شام ساعت 8). ۳-صبح برای انجام سونوگرافی، حتما ناشتا مراجعه شود.
سونوگرافی کلیه و مجاری، مثانه، رحم و ضمام	باید مثانه ی بیمار پر باشد.
سونوگرافی ترانس رکتال - مقعدی	۱-از ۲ روز قبل از انجام این نوع سونوگرافی نباید از باریم انما و یا عکسبرداری با ماده حاجب استفاده کرده باشد، زیرا برای سونوگرافی تداخل ایجاد می کند. ۲- یک ساعت قبل از انجام سونوگرافی روده خود را تخلیه کنید. ۳- در صورت حساسیت به لاتکس حتما بخش رادیولوژی را در جریان قرار دهید.
سونوگرافی های داپلر (رنگی) شریان کلیه ها	صبح، حتما ناشتا مراجعه شود
سی تی اسکن	
بجز در موارد استفاده از مواد کنتراست در بقیه موارد نیاز به آمادگی خاصی ندارد در مواقع استفاده از مواد کنتراست: ناشتا بودن حداقل به میزان ۴ ساعت قبل از تزریق	
پروسیجرها	
نام پروسیجر	آمادگی لازم
استنت گذاری و بالون صفاوی	۱.هشت ساعت قبل از انجام پروسیجر ناشتا باشد. ۲.از مصرف داروهای رقیق کننده مانند آسپرین، هپارین، وارفارین، پلاویکس و ...از سه روز قبل از انجام کار خودداری شود. ۳. در صورت داشتن حساسیت دارویی، غذایی و یا ماده رنگی (ماده حاجب) به بخش تصویربرداری اطلاع دهید. ۴. ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR)
تعبیه درن صفاوی	۱- ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR) ۲- ناشتا بودن به میزان ۴ ساعت
تعبیه درن پلورال	۱- ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR) ۲- ناشتا بودن به میزان ۴ ساعت
آنژیوگرافی مغزی	۱.هشت ساعت قبل از انجام پروسیجر ناشتا باشد. ۲. شیوناحیه کشاله ران یا دست ۳. خوردن داروهای قند خون، فشار خون و یا قلب با مقدار کمی آب بلامانع می باشد.



بیوپسی پروستات	۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکسین ، آسپرین ، وارفارین ، هپارینسه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. شب قبل از انجام نمونه برداری خوردن سوپ یا غذای مایع به عنوان شام ۳. ناشتا بودن به مدت ۵ ساعت ۴. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام نمونه برداریو شیو ناحیه ژنیتال ۵. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام نمونه برداری ۶. ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR)
بیوپسی تیروئید	۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکس ، آسپرین ، وارفارین ، هپارینسه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. ناشتا بودن به مدت ۲ ساعت ۳. ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR)
بیوپسی کبد	۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکس ، آسپرین ، وارفارین ، هپارینسه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. ناشتا بودن به مدت هشت ساعت ۳. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام نمونه برداریو شیو ناحیه ۴. به همراه داشتن عکس های شکم و لگن از MRI-CT sacn
بیوپسی کلیه	۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکس ، آسپرین ، وارفارین ، هپارینسه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. ناشتا بودن به مدت هشت ساعت ۳. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام نمونه برداریو شیو ناحیه ۴. به همراه داشتن عکس های شکم و لگن از MRI-CT sacn ۵. تخلیه مثانه قبل از انجام نمونه برداری.
بیوپسی مهره -بیوپسی استخوانی	۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکس ، آسپرین ، وارفارین ، هپارینسه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. ناشتا بودن به مدت هشت ساعت ۳. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام نمونه برداریو شیو ناحیه ۴. به همراه داشتن عکس های شکم و لگن از MRI-CT sacn
تخلیه کیست هیداتیک	۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکس ، آسپرین ، وارفارین ، هپارین سه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. ناشتا بودن به مدت هشت ساعت ۳. مصرف به موقع و دقیق آنتی بیوتیک ها قبل از انجام پروسیجر ۴. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام نمونه برداری و شیو ناحیه
تزریق در کمر (PRT (Peri Root Therapy	ناشتا بودن از دو ساعت قبل از انجام پروسیجر
لیزر واریس	۱. ناشتا بودن از یک ساعت قبل از انجام پروسیجر ۲. تهیه جوراب واریس



۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکس ، آسپرین ، وارفارین ، هپارینسه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. ناشتا بودن به مدت هشت ساعت ۳. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام پروسیجر و شیو ناحیه ۴. به همراه داشتن عکس های شکم و لگن از MRI-CT sacn	ماکروویو تومور های کبدی
۱. قطع کردن هرگونه داروهای رقیق کننده خون از جمله پلاویکس ، آسپرین ، وارفارین ، هپارینسه روز قبل از انجام پروسیجر با نظر پزشک معالج ۲. ناشتا بودن به مدت هشت ساعت ۳. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام پروسیجر و شیو ناحیه ۴. به همراه داشتن عکس های شکم و لگن از MRI-CT sacn ۵. ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR)	کموآمبولیزاسیون
۱- ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR) ۲- ناشتا بودن به میزان ۴ ساعت	اوزون تراپی
۱- ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR) ۲- ناشتا بودن به میزان ۴ ساعت	میلوگرافی
۱- ضمیمه بودن آزمایش تست های انعقادی (PT-PTT- INR) و تست های عملکردی کلیه (Bun-Cr) ۲- ناشتا بودن به میزان ۸ ساعت ۳. استحمام (دوش گرفتن) قبل از انجام پروسیجر و شیو ناحیه ۴. به همراه داشتن عکس های شکم و لگن از MRI-CT sacn	نفروستومی

تهیه و تنظیم:
گروه آموزش به بیمار و ارتقای سلامت بیمارستان مهراد
تاریخ بازنگری : اردیبهشت ۱۴۰۵