

آمادگی کولونوسکوپی

6 عدد پودر پیدرولاکس - 2 عدد شیاف بیزاکودیل از داروخانه تهیه نمایید.

یک روز قبل از کولونوسکوپی از ساعت 10 صبح آمادگی روده را شروع نمایید. از شروع آمادگی غذا میل نفرمایید. 6 عدد پودر پیدرولاکس را داخل 24 لیوان آب حل نمایید. هر 30 دقیقه یک لیوان محلول تهیه شده را میل نمایید تا تمام شود. برای آمادگی بهتر میتوانید در فواصل مصرف پودر پیدرولاکس راه بروید. ساعت 6 عصر و ساعت 8 عصر یک شیاف بیزاکودیل از راه معقد استعمال نمایید. فقط می توانید از آب میوه انگور سفید و آب میوه سیب پاکتی میل نمایید و لطفاً آب میوه طبیعی و رنگی میل نفرمایید. چای بعلاوه عسل بدون موم، آب مرغ یا آب گوشت کاملاً صاف شده نیز میتوانید میل کنید. از 8 ساعت قبل از کولونوسکوپی ناشتا بمانید.

کولونوسکوپی

کولونوسکوپی وسیله ای است که پزشک به کمک دوربین قادر به دیدن سطح داخلی کولون (روده بزرگ) و انتهای روده باریک (ترمینال ایلئوم) می باشد. گاهی اقدامات درمانی مثل برداشتن پولیپ می تواند از این طریق انجام شود. کولونوسکوپی روش بسیار مفید برای پیدا کردن ضایعات پیش سرطانی و درمان به موقع آن می باشد که در موارد (سابقه فامیلی و یا در سنین بالای 50 سال) به صورت غربالگری انجام می شود. نمونه برداری (بیوپسی) در حین کولونوسکوپی در صورت لزوم به طور معمول انجام میشود و به تشخیص بیماری شما کمک می نماید.

نکات قابل توجه قبل از انجام کولونوسکوپی :

- در صورت وجود دیابت و مصرف انسولین - فشارخون - بیماری قلبی (تعویض دریچه - بای پس و) بیماری کبدی - انواع هپاتیت بی و هپاتیت سی ، ...) ایدز ، بیماری کلیوی ، مصرف قرص پلاویکس - قرص اسویکس - قرص آسپرین و داروهای ضد تشنج و ... پزشک خود را مطلع نمایید.
- در صورت سابقه جراحی - شیمی درمانی و یا رادیوتراپی اطلاع دهید و شرح عمل و کلیه مدارک را با خود همراه داشته باشید.
- در صورت نیاز به برداشتن پولیپ (سابقه فامیلی - سن بالای 50 سال و) از یک هفته قبل آسپرین و از چند روز قبل وارفارین، قرص آسپرین ، قرص پلاویکس، قرص اسویکس می بایست طبق نظر پزشک معالج قلب قطع و آزمایشات انعقاد پلاکت INR - PTT - PT را همراه داشته باشید.
- از آوردن کلیه فلزات (طلا - ساعت و زیورآلات) و دندان مصنوعی خودداری نمایید.
- یک نفر همراه داشته باشید و از رانندگی بعد از کولونوسکوپی پرهیز نمایید.