

## آگاهی های لازم بعد از TACE

- بیمار ممکن است تا هفته بیحال، بی اشتها و حالت شبیه به سرماخوردگی داشته باشد که باید علامت درمانی شود. یعنی اگر لازم بود سرم وصل گردد یا از داروی ضد تهوع و ضد درد دریافت کند.
- در صورتی که بعد از یک هفته این علائم برطرف نشد. آزمایشات کبدی باید انجام شود. و به اطلاع پزشک معالج برسد.
- ممکن است بیمار تب مختصری تا ۳۷/۸ داشته باشد. در صورت تب بیشتر باید آنتی بیوتیک دریافت کند.
- ممکن است گاهی محل کشاله ران یبه علت خون تیره رنگ شود که در صورت شدید بودن باید به پزشک معالج مراجعه نماید.
- تا ۲ ساعت بعد از انجام TACE چیزی نخورد.

- داروهای ضد انعقادی نظیر آسپرین و پلاویکس و وارفارین باید طبق نظر پزشک معالج از حدود ۵ روز قبل قطع شود. سایر داروها منعی ندارد.
- بیمار از ۶ ساعت قبل تا زمان عمل باید ناشتا شود.
- استحمام و زدودن موهای زائد کشاله ران
- همراه داشتن مدارک مربوط به بیماری
- حضور یک همراه جهت انجام اموراتاری
- در صورتیکه بیماری دیابت یا قلبی دارید حتماً به پزشک معالج اطلاع دهید.

## Transarterial Chemoembolization (TACE)

کموآمبولیزاسیون نوعی شیمی درمانی است که از طریق آنژیوگرافی انجام می شود. این روش امکان تزریق مستقیم داروی شیمی درمانی به شریان های تغذیه کننده تومورها را نشان می دهد و باعث میشود دارو با غلظت بیشتری وارد تومور گردد و عوارض مصرف دارو کمتر شود.

### مزایا کموآمبولیزاسیون :

- امکان رسیدن غلظت بیشتری از دارو به درون تومور (از شیمی درمانی معمولی حدود ۱۰ الی ۲۵ برابر بیشتر)
- افزایش مدت زمان اثر درمان (میزان قابل توجهی از دارو تا یک ماه بعد در کبد یافت میشود)
- عوارض کمتر در انجام شیمی درمانی مستقیم لازم به ذکر است که روش کموآمبولیزاسیون معمولاً به عنوان مکمل در شیمی درمانی جهت کنترل ضایعات کبدی مورد استفاده قرار میگیرد و جایگزین شیمی درمانی عمومی نخواهد شد.

### آگاهی های لازم جهت بیماران قبل از (TACE)

- معمولاً این نوع درمان باید یک هفته با شیمی درمانی تزریقی فاصله داشته باشد.
- آزمایش های کبدی باید انجام شود. از نظر اینکه کبد بیمار تحمل این درمان را داشته باشد.



## کمو امبولیزاسیون

تهیه و تنظیم:

گروه آموزش به بیمار و ارتقای سلامت

بیمارستان مهراد

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

۱- معمولاً TACE در دو جلسه با فاصله ۴ هفته انجام می شود. بنابراین بیمارانی که جلسه اول TACE را انجام داده اند برای ۴ هفته بعد جلسه دوم هماهنگ می شود و قبل از جلسه دوم حتما باید تست های کبدی /کلیوی /انعقادی /CBC انجام شود .

۲- در صورتی که جلسه دوم TACE باشد به بیمار توصیه می شود که ۴ هفته بعد CT یا MRI دینامیک از شکم انجام شود.

- تا ۶ ساعت از تخت پایین نیاید (CBR).
- صبح روز بعد در صورت **STABLE** بودن (نداشتن مشکل) مرخص می باشد .
- در زمان ترخیص داروهای ضد درد، ضد تهوع ، آنتی بیوتیک داده خواهد شد .
- بعد از یک هفته پس از انجام عمل قادر به انجام فعالیت های عادی می باشد.
- روش انجام عمل کما مبولیزاسیون
- این کار تحت هدایت دستگاه تصویر برداری همراه با بی حسی موضعی انجام می شود. ابتدا از طریق شریان با بی حسی موضعی انجام می شود. ابتدا از طریق شریان کشاله ران راست کانتر مخصوصی وارد شریان کبد و مشخص شدن عروق تغذیه کننده تومور کانتر به داخل عروق خون رسان تومور هدایت می شود و داروی شیمی درمانی همراه با موا مسدود کننده به داخل عروق خون رسان تومور تزریق می شود .